

Памятка о мерах

Бешенство - острое инфекционное заболевание вирусной этиологии животных и человека, характеризующееся поражением центральной нервной системы и абсолютной летальностью.

Резервуаром и главным источником возбудителя являются дикие хищники (лисицы, волки и др.), передающие инфекцию беспризорным собакам и кошкам, которые служат «передаточным звеном» между дикими и домашними животными. Заболевание бешенством подвержены не только дикие плотоядные, но домашние (собаки, кошки) и сельскохозяйственные животные, в том числе овцы, коровы, лошади и др. Для бешенства диких плотоядных наиболее характерны потеря страха перед людьми и агрессивность. Заболевшие лисы, енотовидные собаки, барсуки, куницы среди дня могут появиться в населенном пункте и вступить в драку с собаками, не убегают при приближении людей. Дикие животные нередко проникают в скотные дворы, забегают в стада, нападают на скот, нередко нападают на людей.

- 1. При укусе большого животного**
- 2. При попадании слюны большого животного на поврежденные участки кожи (царапины, ссадины, раны)**



С момента заражения до появления первых симптомов заболевания проходит от 2 недель до 3 месяцев. **Поведение домашнего животного меняется: оно становится беспокойным, может прятаться в темных углах.** Меняется иногда и голос: у собак лай становится хриплым. В это же время у собаки

появляется светобоязнь, она грызет и лижет место укуса, зрачки ее расширяются. Возможно рвота и слюнотечение.


Боязни воды (гидрофобии) у собаки часто не наблюдается. При буйной форме бешенства собака срывается с цепи, проглатывает несъедобные предметы, убегает из дома и нападает на встречных животных и людей. При тихой форме бешенства - параличи

отдельных групп мышц. **При обеих формах бешенства животное погибает от параличей на 3-11 день от начала заболевания.** У кошек бешенство сопровождается большой агрессивностью к собакам и людям:



профилактики бешенства


У крупного рогатого скота бешенство проявляется – сильным беспокойством, слюнотечением, судорогами отдельных групп мышц с последующими параличами; у свиней - резким возбуждением, хрюканьем, слюнотечением и расчёсыванием места укуса; у лошадей преобладает буйная форма.



Меры профилактики бешенства:

- все домашние собаки и кошки, вне зависимости от породы, должны ежегодно прививаться против бешенства;
- домашнюю собаку на улице необходимо держать на коротком поводке, обязательно наморднике, не допускать общения с бродячими сородичами. Выгуливать собак нужно в специально отведенных для этого местах;

- при первых признаках несвойственного поведения домашнего животного (перестает отзываться на кличку, отказывается от еды, становится агрессивным или, напротив, вялым) нужно немедленно обратиться за помощью к ветеринару;
- в целях профилактики бешенства все пострадавшие от укусов, оцарапывания или ослонения, нанесенного любым животным, следует немедленно обратиться в травматологический пункт или хирургический кабинет лечебно-профилактического учреждения по месту жительства для получения квалифицированной медицинской помощи;
- начать курс антирабических прививок (прививок против бешенства) необходимо как можно раньше, так как они эффективны в инкубационном периоде заболевания;
- за животным, нанесшим укус, устанавливается 10-дневное наблюдение ветеринарными специалистами;
- следует помнить, что бешенство является смертельным заболеванием, и антирабические прививки являются надежным средством его предупреждения



**ПОМНИТЕ, ЧТО ЗАБОЛЕВАНИЕ
БЕШЕНСТВОМ НЕЛЬЗЯ ВЫЛЕЧИТЬ,
НО МОЖНО ПРЕДУПРЕДИТЬ!**